



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03038592 A

(43) Date of publication of application: 19.02.1991

(51) Int. Cl. C07F 9/10

A61K 31/685, A61K 33/06, A61K 35/78

(21) Application number: 01173264

(22) Date of filing: 04.07.1989

(71) Applicant: YAGI AKIRA

(72) Inventor: YAGI AKIRA

(54) NOVEL PHOSPHATIDYLCHOLINE CALCIUM AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:


NEW MATERIAL: The compound of formula (R is fatty acid residue) wherein the composition of fatty acid bonded to β - and γ -sites of glycerol through ester bonds is C14:0=0.3, C16:0=17.8, C16:1=0.7, C18:0=1.0, C18:1=43.1, C18:2=36.2 and C18:3=0.7.

USE: An active enzyme suppressing agent or anti-inflammatory agent.

PREPARATION: An adlay seed fraction soluble in methanol and chloroform and scarcely soluble in acetone is purified by silica gel chromatography. Prefer

ably, the seed is homogenized in a mixture of chloroform and methanol and washed, the obtained whole lipid fraction is subjected to silica gel chromatography successively using chloroform, acetone and methanol as solvents and the obtained methanol fraction is again subjected to silica gel chromatography using a chloroform-methanol mixture.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio



⑫ 公開特許公報(A) 平3-38592

⑤ Int. Cl.³C 07 F 9/10
A 61 K 31/685
33/06
35/78

識別記号

A D U
A E D
A B E U

庁内整理番号

A 8619-4H
7431-4C
7431-4C
8412-4C

⑬ 公開 平成3年(1991)2月19日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

⑭ 発明の名称 新規ホスファチジルコリンカルシウムとその製法

⑯ 特 願 平1-173264

⑰ 出 願 平1(1989)7月4日

特許法第30条第1項適用 Vol.25, No.3, 1989「医薬ジャーナル1989年3月号」に発表

⑱ 発 明 者 八 木 晟 福岡県粕屋郡粕屋町仲原446-4

⑲ 出 願 人 八 木 晟 福岡県粕屋郡粕屋町仲原446-4

⑳ 代 理 人 弁理士 門 脇 清

明 細 書

1. 発明の名称

新規ホスファチジルコリンカルシウムとその製法

2. 特許請求の範囲

1 グリセリンのβ位及びγ位にエステル結合する脂肪酸組成が、C_{14:0} 0.3, C_{16:0} 17.8, C_{16:1} 0.7, C_{18:0} 1.0, C_{18:1} 43.1, C_{18:2} 36.2, C_{18:3} 0.7である新規ホスファチジルコリンカルシウム。

2 請求項1のホスファチジルコリンカルシウムが、ハトムギの種子に由来するものである請求項1記載の化合物。

3 ハトムギの種子のメタノール及びクロロホルム可溶性、アセトン難溶性画分をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製することを特徴とする脂肪酸組成が、C_{14:0} 0.3, C_{16:0} 17.8, C_{16:1} 0.7, C_{18:0} 1.0, C_{18:1} 43.1, C_{18:2} 36.2, C_{18:3} 0.7である新規ホスファチジルコリンカルシウムの製法。

3. 発明の詳細な説明

【発明の目的】

【産業上の利用分野】


本発明は、活性酸素抑制剤乃至抗炎症剤等として有用な新規ホスファチジルコリンカルシウム及びこれを天然物から製造する方法に関する。

【従来の技術】

イネ科の植物ハトムギ(*Coix lachryma-jobi* L. var. *ma-yuen* Stapf)の種子は、古来“薏苡仁(ヨクイニン)”と呼ばれ、漢方では、利尿によるネフローゼの治療、肺腫瘍の解毒排膿、筋肉の痙攣痛の緩解、扁平イボの消退などに効有りとされ、一部製剤化されているのみでなく、民間薬としてもハトムギ茶等として広く用いられている。

ところで、近來和漢薬に対する再評価が進む中で、既に1957年から翌年にかけて中山によりヨクイニンのエタノール抽出液及びエーテル脱脂後のアセトン抽出液のマウスのエールリッヒ腹水癌に対する抑制効果が発表されたのを契機として本品に対する一連の研究が始まり、1961年浮田らによ

リヨクイニンから抗腫瘍有効成分として Colxeno-
lide (下式) と称する C_{13} 不飽和脂肪酸が 2, 3-
ブタンジオールと結合した脂質の単離が報じら
れたが、追試により存在は確認されなかった。



その後、近年に至るもヨクイニンから明確に制
癌作用有りとされる特有成分は見つかっていない。

近年に至り、ヒドロキシラジカル OH、ヒドロペ
ルオキシラジカル HO_2 、スーパーオキシド O_2^- 、
アルコオキシラジカル LO などの活性酸素種と発癌
又は制癌作用との関係が注目されるようになり、
不飽和脂肪酸の多量摂取が大腸癌の発癌と関連す
るかの疫学的研究結果が示されている。不飽和脂
肪酸のエポキシ化が活性酸素種により起こることは
周知であるが、他方、不飽和脂肪酸の摂取は食
物として不可避的であるので、これら活性酸素種

の除去又は補足する作用を有する薬剤 (ラジカル
・スカベンジャー) の開発は、ヒトの保健に重要
な役割を有すべきことが予測される。

同様に、近年注目されている活性酸素種の影響
は炎症時の発赤、腫脹及び疼痛との関連である。
炎症の引き金となるプロスタグランジン類の代謝
物によって白血球が患部まで遊走し、活性酸素種
と共に発赤、腫脹及び疼痛などの症状を起こす。
それ故、ラジカル・スカベンジャーによる活性酸
素の不活化乃至封じ込めは、炎症防止のため意義
を有することになる。しかしヨクイニン中にラジ
カル・スカベンジャーとして有効な成分が存在す
るやもこれまで知られていない。

[発明が解決しようとする課題]

そこで本発明は、顕著なラジカル・スカベン
ジャー作用を有する新しいホスファチジルコリン
カルシウムを提供すること及びこの物質をヨクイ
ニンから抽出する方法を提供することを目的とす
る。

(以下余白)

【発明の構成】

[課題を解決するための手段]

(1) 概念

人好中球を opsonized zymosan で刺激して 4 種
の活性酸素 (O_2^- ; H_2O_2 ; OH 及び化学ルミネス
センス) を産生させたときのヨクイニンエキスの挙
動は既に報告されており (丹羽ら、皮膚科紀要、
81, pp.321-333 (1986)、ヨクイニン油が好中球の
産生する活性酸素を抑制し、かつ好中球やリンパ
球の細胞膜のメチルトランスフェラーゼ、ホスホ
リパーゼ A_2 及びプロスタグランジン E_2 の産生を有
意に抑制したことから、本油は炎症細胞膜に作用
して細胞膜を安定化させる作用があるとされてい
る。しかし、ヨクイニン油中の如何なる成分がラ
ジカル・スカベンジャーとして有効であるかは未
だ明らかでない。

(2) 概要

しかるに本発明者は、ヨクイニン脂質中の種々
の画分につきラット好塩基性白血病細胞 (RBL-1)
を用いて生物学的に検定した結果、該脂質中のホ

スファチジルコリン画分が抗炎活性を有する事実
を確かめ、該画分の化学構造の解明とその抽出法
の開発と併せ本発明に到達した。即ち、本発明
は、

I グリセリンの β 位及び α 位にエステル結合
する脂肪酸組成が、 $\text{C}_{14}:n$ 0.3, $\text{C}_{16}:n$ 17.8,
 $\text{C}_{18}:n$ 0.7, $\text{C}_{18}:o$ 1.0, $\text{C}_{18}:i$ 43.1, $\text{C}_{18}:s$
36.2, $\text{C}_{19}:s$ 0.7 である新規ホスファチジルコ
リンカルシウム。

及び

II ハトムギの種子のメタノール及びクロロ
ホルム可溶性、アセトン難溶性画分をシリカゲ
ルクロマトグラフィーにより精製することを特
徴とする脂肪酸組成が、 $\text{C}_{14}:n$ 0.3, $\text{C}_{16}:n$
17.8, $\text{C}_{16}:i$ 0.7, $\text{C}_{18}:n$ 1.0, $\text{C}_{18}:i$ 43.1,
 $\text{C}_{18}:s$ 36.2, $\text{C}_{19}:s$ 0.7 である新規ホスファチ
ジルコリンカルシウム製法。

を要旨とするものである。以下、発明の構成と関
連する主要な事項につき項分けして述べる。

(以下余白)

(3) 新規ホスファチジルコリンカルシウムの構造解析

後記方法にてハトムギの種子(ヨクイニン)から単離され、卵レシチンの標品と同一のTLCパターンを示すと共に、かつ生物学的検定により有効性を確かめた精製試料(NY-134(又はPC-1))3.7mgをホスホリパーゼCとpH7.4の0.1Mトリス緩衝液中インキュベート後、エーテルで抽出し、エーテル抽出部と水層を夫々TLCで検討して、上記試料がハトムギ由来のレシチンであると決定した。エーテル抽出部は、メタノール性水酸化ナトリウムでメタノール分解(メタノライシス)し、TLCで精製して遊離脂肪酸のメチルエステルを分離した。このエステルをガスクロマトグラフィーにより分析し、標品と対照した結果、第2図記載のクロマトグラムが得られ、この結果から試料の脂肪酸組成は下表-1の通りであることが判った。

(以下余白)


表-1

不飽和二重結合数	炭素数 / %		
	14	16	18
0	0.3	17.8	1.0
1	--	0.7	43.4
2	--	--	36.2
3	--	--	0.7

即ち本試料の構成脂肪酸は、少量のミリスチン酸、ヘキサデセン酸(二重結合の位置により三種の異性体が公知であるが、本試料の二重結合位置は未確定)、ステアリン酸及びリノレン酸と多量のパルミチン酸、オレイン酸及びリノール酸とから構成され、構成脂肪酸中のパルミチン酸：オレイン酸：リノール酸の比は18：43：36であって、従来言われてきたヨクイニン油中の構成脂肪酸の $1/2$ がオレイン酸、 $1/4$ がリノール酸とされる割合に比べてリノール酸の量がかなり多い。しかし、沼田らによるヨクイニン油中の制癌性成分の脂肪酸組成とは一致している(第43回日本癌学会

要旨集919頁(1984))。

原子吸光分析の結果、上記ホスファチジルコリンカルシウムは、その2モルに対し1モルのCa原子が恐らくイオン結合した下式の構造を有する。



(式中“R”は上述の脂肪酸残基を示す。)

(4) 新規ホスファチジルコリンカルシウムの製造

本発明のホスファチジルコリンカルシウムは、ハトムギ(*Colx lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* Stapf)及びジュズダマ(*C. Lacrymal.*)の種子に含まれる。従って、原料としてはどちらを用いてもよいが、後者は野生で栽培されておらず、しかも種皮が極めて硬いので原料の集荷及び取扱の両面で不利である。これに反し前者は毎年圃場で栽培

でき、かつ種皮もそれ程硬くはないので、原料として適している。

上記ホスファチジルコリンカルシウムは、クロロホルムに良く溶け、低級脂肪酸アルコールに可溶、低級脂肪酸ケトンには溶け難い。従って、この性質を利用して、クロロホルム又はそれとメタノール等の低級脂肪酸アルコールとの混液で全脂質を抽出後、アセトン又はメチルエチルケトン(MEK)などの溶媒で中性脂肪を除去した残部をシリカゲル、アルミナ等のクロマトグラフィーに付して目的成分を単離するのが常道である。但し、ホスファチジルコリンと同じ窒素原子含有ホスファチジン酸誘導体として、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセリン等が夾雑し易いので、分析用又は生物検定用試料の作成には、溶出用混合溶媒の混合比を適宜変更するなどの配慮が必要である。4kgのヨクイニンを使用した製造試験における対象ホスファチジルコリンカルシウム(NY-134)の収量は0.81g(収率0.02%)であった。

〔作用〕

本発明のホスファチジルコリンカルシウムを上記RBL-1細胞の培養物に加えて5-ヒドロキシエイコサテトラエン酸(5-HETE)、ロイコトリエンB₄(LTB₄)、12-ヒドロキシ-5, 8, 10-ヘプタデカトリエン酸(HHT)及び12-ヒドロキシエイコサテトラエン酸(12-HETE)の産生状況を高速液体クロマトグラフィーで追跡すると、起炎物質の一つであるHHT及び12-HETE(白血球誘引及び血管透過性抗進物質)の産生が抑制され、その効果は、HHTについては強力な抗炎性物質(HHT阻害剤)であるインドメタシンより弱く、また12-HETEについては12-HHT阻害剤であるエスクレチンより弱い。しかし上記新規ホスファチドは、HHT及び12-HETEの双方に対し阻害効果を示すので、天然物由来の緩和な抗炎剤として効果を期待できる。なお今後の研究によっては、既に実験動物癌に対し効果が確認されているヨクイニン油と同様の制癌作用も予期される。

100 検出器(HETE及びHHT用 240nm, LTB₄用 270nm)、逆相カラム YMC-A 302(4.6×150mm、山村化学製)

③ 溶出剤：アセトニトリル：メタノール：水：酢酸(pH 4.0:300:100:300:0.7(LTB₄用)、150:50:110:0.02(HETE類用))、流量1.0 ml/分

④ TLC：脂肪酸及びホスファチジルエタノールアミンに対しシリカゲル プレート(Merck)、溶媒1 クロロホルム-メタノール(6:1)、検出 10%硫酸；溶媒2 クロロホルム-メタノール-水(65:24:4)、検出 ニンヒドリン及びDittmer 試薬(J. Lip. Res., 5,126(1964))、ホスファチジルコリンに対しセルロース プレート(Merck)、溶媒 ブタノール-酢酸-水(5:3:1)、検出 Hanes-Isherwood 試薬(Nature, 164,1107(1949))。

(c)原子吸光分析：PC-1 4.3mgを20%塩酸-エタノール10mlに解かし、1%塩酸で10mlに調整して使用。

(d) PC-1 中のカルシウムの定性定量分析：溶

〔実施例〕

以下、本発明に関連する種々の実験結果につき記載するが、記載は勿論例示であって、発明思想の制限又は限定を意味するものではない。

(A) 使用材料及び方法

(a) 試薬

① ホスホリパーゼC：Sigma タイプ I(クロストリジウム ペルフリンゲンス由来)、活性：4単位/mg。

② ホスファチジルエタノールアミン及びホスファチジルコリン：Faureの方法(Bull. Soc. Chem. Biol., 32,503(1950))に従い調製。

③ 脂肪酸メチルエステル：NIH Mixtures (SRL Co., 米国製)。

(b) 分析

① GLCカラム：10%エチレングリコールサクシネート、chromosorb W AW DMCS(2.6 mm × 2.1m)、カラム温度 180℃、検出器温度 200℃、N₂ガス流量 50ml/分。

② HPLC：Varian Model 5000 LC, UV-

液1mlに妨害抑制剤として塩化ランタン溶液を1%容の割合に加え、日立偏光ゼーマン原子吸光分光光度計で蛍光分析。蛍光：ランプ電流 7.5 mA、波長 422.7 nm。

(e) PC-1 中のリンの定性定量分析：試料を普通のキールダール法で処理し、反応物をTechnicon Phosphor Autoanalyzer II-C型を用い、モリブデン青発色法により測定。

(B) 新規ホスファチジルコリンカルシウムの製造 (第1図参照)

国立中国農業試験場(福山市)で収穫されたハトムギの種子(ヨクイニン)4kgをクロロホルム-メタノール混液(2:1)11g中で10分間均質化後、メタノール-0.1M塩化カリ混液(1:1)でPolch洗浄した。得られた全リビド分画(161g)を溶媒として順次クロロホルム、アセトン及びメタノールを用い、シリカゲル・クロマトグラフィーに付し、夫々中性、ホスファチジルエタノールアミン及びホスファチジルコリン分画を得た。

メタノール分画 (4.5g) をクロロホルム-メタノール混液 (9:1 及び 4:6) を用いて再度シリカゲルクロマトグラフィーに付し、ホスファチジルコリン分画 (PC-1) 0.81g を得た。なお、各試料の純度は、標品と TLC で検定した。

(C) 新規ホスファチジルコリンカルシウムの酵素分解

Ottolenghi (Methods Enzymol., 14, 188 (1969)) の方法により PC-1 をホスホリパーゼ C で加水分解した。即ち、PC-1 3.7mg をエーテル 2 ml 中に溶かし、これに 0.02 M の塩化カルシウムを含む 0.1 M トリス緩衝液 (pH 7.4) 0.1 ml を加え、室温で 16 時間インキュベートした。次いで、代謝物の溶液をエーテル可溶性の脂肪酸分画と水溶性のホスホリルコリン分画とに分け、前者の分画を、イアトロビーズでクロマトグラフし、ヘキサーン-ジエチルエーテル (2:1) の混液で溶出した。溶出物を TLC で卵黄由来ホスファチジルコリンの標品と比較した結果、試料 PC-1 はホスファチジルコリンであることが確認された。更に水層を凍結乾燥

後、セルロースプレートを用いて n-ブタン-酢酸-水 (5:3:1) 混液で添加し、これに Hans-Isherwood 試薬を噴霧、60℃ で 30 分間加熱、乾燥後、λ 254 nm の UV ランプ下で 15~25 分間照射した結果、試料と卵黄由来のホスファチジルコリンからの精製物との R_f 値が一致した (第 3 図参照)。

(D) アルカリ性メタノライシス

エーテル可溶性を岸本らの方法 (岸本ら, J. Lip. Res., 6, 435 (1965)) に従い、0.21 規定メタノール性苛性ソーダを用い、室温で 30 分間メタノリシス後、生産的 TLC (溶媒ヘキサン:エーテル=10:1) で精製し、脂肪酸のメチルエステルを得た。GLC による分析の結果、以下の酸組成が示された (第 2 図参照; (i): 検体、(o): 標準品)。

C_{14:0} 0.3, C_{16:0} 17.8, C_{16:1} 0.7,
C_{18:0} 1.0, C_{18:1} 43.4, C_{18:2} 36.2,
C_{18:3} 0.7.

(以下余白)

(E) 生物学的検定

(a) 略称

5-HETE: 5-ヒドロキシエイコサテトラエン酸

12-HETE: 12-ヒドロキシエイコサテトラエン酸

LTB₄: ロイコトリエン B₄

HH T: 12-ヒドロキシ-5, 8, 10-ヘプタデカトリエン酸

(b) 方法

逆相 HPLC によるラット好塩基性白血球細胞 (RBL-1) 中の LTB₄ と 5-HETE の抑制挙動の測定は寺尾らの方法 (J. Chem. Soc. Perkin Trans 1, 1591 (1983)) に従って行った。即ち、RBL 細胞を 10⁷ 個/ml の割合で 10% の仔牛血清を加えた RPM-1640 培地中培養し、これにアラキドン酸 50 μg、カルシウム・イオノフォア (A-23187) 1 μg 及び種々の濃度の試料 (内部標準としての 2-(12-ヒドロキシデカ-5, 10-ジエニル)-3, 5, 6-トリメチ

ル-1, 4-ベンゾキノン), LTB₄ 及び 5-HETE に対する阻害剤)、インドメタシン (HH T に対する阻害剤) 及びエスクレチン (12-HETE に対する阻害剤) を含む。) を加え、更に 15 分間培養を続けた後、エタノールを加えて反応を停止させ、遠心して細胞を除き、上清中における代謝産物を HPLC により分析した。

ラット血小板により形成された HH T 及び 12-HETE の逆相 HPLC による測定は寺尾らの方法 (ビタミン 59 巻 (5-6 号) 211-219 (1985)) に従って実施した。

即ち、0.25 ml の血小板に富む血清をラットの血液から集め、10⁶ 細胞/ml に調製した。これにアラキドン酸 125 μg、カルシウム・イオノフォア (A-23187) 1 μg を加え、37℃ で 15 分間培養した。その後、エタノールを加えて反応を停止させ、反応混合物を遠心後、上清を HPLC にて分析した。

結果を下表-2 に示す。表示の如く、PC-1

【發明の效果】

以上説明した通り、本発明は、活性酸素抑制剤乃至抗炎症剤等として有用な新規ホスファチジルコリンカルシウム及びこれを天然物から製造する方法を提供できたことにより、国民の健康増進及び健康維持に寄与しうる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、ハトムギから新規ホスファチジルコリンカルシウムを製造する工程を示す工程図、第2図は、ハトムギ由来のホスファチジルコリンカルシウムを構成する脂肪酸のメチルエステルのガスクロマトグラム(I)と標準混合脂肪酸メチルエステルのガスクロマトグラム(II)、第3図は、発明ホスファチジルコリンカルシウム(A)及び卵黄ホスファチジルコリン(B)の各酵素分解物のTLCパターンである。各図の説明は、夫々各図中に記載済み。


特許出願人 八 木 晟
代 理 人 弁 理 士 門 脇 淳




表-2

薬剤/ 温度 代謝物	PC-1(臭明品)	標準品	イソドメタリン	エスクレチン
	10 ⁻⁴ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁸	10 ⁻⁴ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁸	10 ⁻⁴ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁸	10 ⁻⁴ 10 ⁻⁶ 10 ⁻⁸
L T B ₄	- 25 16	- 100 94	- - -	- - -
5-HETE	- 14 10	- 99 99	- - -	- - -
H H T	55 14 0	- - -	98 48 24	- - -
12-HETE	49 17 0	- - -	31 34 20	81 55 22

第 1 図



第 2 回



第 3 图

NY-13	dark yellow	0	yellow
NY-131			
NY-132		purple	
NY-133			
NY-134		0	

10% H₂SO₄
reagent

Solvent:
CHCl₃-MeOH
(6:1)

NY-13		blue	(+)
NY-132			(+)
NY-134			
PC			
PE			(+)
SM			
Phospholipids Fraction of Rat Brain			

Dittmer reagent

Ninhydrin reagent: (+)

Solvent:
CHCl₃-MeOH-H₂O
(65:24:4)

PC: phosphatidylcholine (lecithin)
PE: phosphatidylethanolamine
SM: sphingomyelin

BEST AVAILABLE COPY